

# Mögliche Folgeerscheinungen von instabilem Atlas

BEI TIEREN

## Hund



1. steifer Hals und Kopf
2. Kopf nach rechts gestellt
3. verspannter Rücken
4. krümmen der Wirbelsäule zum Kot absetzen erschwert
5. schiefe Schwanzstellungungleiches Gangbild
6. Hund in sich schief
7. Krallen ungleichmäßig abgenutzt
8. Unruhe „Überdreht Sein“
9. Verhaltensauffälligkeiten
10. Bissigkeit
11. Angst
12. Verdauungsstörungen
13. „Depressionen“ / Niedergeschlagenheit

## Katze



1. Blasensteine
2. Verhaltensauffälligkeiten
3. Unruhe, Aggressivität
4. Fehlende Flexibilität im Körper oder Schwanz
5. Bei Beobachtung: offensichtliche Schmerzen
6. Depression

## Pferd



1. Kopfdrehung nach links erschwert
2. Schulterlahmheit, Sattelzwang
3. Mangelnde Beweglichkeit in Hals- und Kopfbereich
4. Husten aufgrund von Blockaden im Hals und Zungengrund
5. Wirbelblockierungen HWS, Rückensteifigkeit
6. Mangelnde Beweglichkeit im mittleren Rücken
7. Empfindlicher Rücken mit Verspannungen im Longitudinalis Muskel
8. Beckenschiefstand, Blockierungen im Ileo-Sakralgelenk,
9. „Hochstehender“ hinterer Rücken
10. Schmerzen im Brustbeinbereich
11. Verspannungen der Zwischenrippenmuskeln, daher Atemrestriktionen
12. Schiefer Schweif, Probleme mit der Schweifrübe
13. Entzündungen und Arthrose/Arthritis der Gelenke
14. Widersetzlichkeit in eine Richtung, Steigen und Bocken
15. Nervosität und psychische Anspannung, Angst
16. innere Unruhe und mangelnde Losgelöstheit (Gelassenheit?)
17. Verhaltensauffälligkeiten wie zum Beispiel Scheuen ohne ersichtlichen wichtigen Grund
18. Mangelnde Kommunikationsfähigkeit oder -bereitschaft mit dem Reiter
19. Ungleiches Gangmaß - „natürliche“ Schiefe
20. Verdauungsstörungen

## Nutztiere:

1. Allgemeine gesundheitliche Schwäche und Anfälligkeit
2. Fruchtbarkeit – erschwerte Trächtigkeit
3. Milchproduktion
4. Unruhe, Agression
5. Probleme im Bewegungsapparat
6. Schmerzen